

No.	Study NO.	Title	Title in Arabic	ARABIC SUMMARY	Single Vs Multiple Site	Site Location	PI	Department	E-mail	Sponsor
1	RC08/029	Real Life Experience of Erlotinib in Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer in the Middle Eastern Countries (REALME)	تجربة حقيقية لعقار Erlotinib في المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة غير صغير الخلية المتقدم في دول الشرق الأوسط	إن المشاركة في هذا البحث اختيارية تماماً. وإذا قررت المشاركة فإن علاجتك وموقف طبيبك تجاهك لن يتغيران.	M	Al Ahsa Riyadh Jeddah	Dr. Mohammed Essam EIdin Fawzy Dr. Abdulrahman Jazieh Dr. Turki Fayae	Oncology Oncology Oncology	jazieha@ngha.med.sa	KAIMRC
2	RC08/053	Multicenter Prospective Non-Randomized Phase III Study on Treatment of Newly Diagnosed Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia	دراسة متعددة المراكز من النوع المرتقب غير عشوائية، في المرحلة الثالثة لعلاج الأطفال المصابين بسرطان الدم اللمفاوي الحاد	الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو البحث في علاج لاخفاض المصابين حديثا بسرطان الدم اللمفاوي الحاد	S	Jeddah	Dr. Wasil Jastaniah	Pediatric	jastaniahwa@ngha.med.sa	KAIMRC
3	RC08/118	A Randomized, Controlled, Open Label Study of the Efficacy and Safety of the Low Molecular Weight Heparin (LMWH), Lovenox™ Enoxaparin versus Hika™ Heparin™ (Unfractionated Heparin) for Prevention of Venous Thromboembolism (VTE) in Gynecologic Oncology	دراسة عشوائية، مضبوطة، مفتوحة لدراسة سلامة وفعالية عقار الهيبارين المنخفض الوزن الجزيئي مقابل عقار الهيبارين غير المنخفض الوزن الجزيئي من ناحية الوقاية من الجلطات الدموية الوريدية (VTE) في الأورام النسائية	تهدف هذه الدراسة لمقارنة سلامة وفعالية عقار الهيبارين المنخفض الوزن الجزيئي مقابل عقار الهيبارين غير المنخفض الوزن الجزيئي من ناحية الوقاية من الجلطات الدموية الوريدية (VTE) في الأورام النسائية	S	Riyadh	Dr. Abdulrahman Jazieh	Oncology	jazieha@ngha.med.sa	KAIMRC
4	RC09/081	The Effectiveness of Fluoride Varnish when Incorporated into Vaccination Schedules in the Prevention of Early Childhood Caries in Saudi Children at the National Guard.	فعالية طلاء الفلورايد في منع تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة	الهدف من هذه الدراسة الى تقييم فعالية طلاء الفلورايد في منع تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة	S	Jeddah	Dr. Samar Mashabi	PREVENTIVE MEDICINE DEPARTMENT PRIMARY HEALTH CARE	mashabiso@ngha.med.sa	KAIMRC
5	RC09/120	Effect of N-methyl D-aspartate(NMDA) receptor antagonist Dextrometorphon on Opiods analgesia and tolerance in Pediatric Intensive Care Unit Patients	تقييم استخدام العقار ديكستروميثورفان المصنف كمضاد للمستقبل بالترافق مع مسكنات الألم وأثره على التقليل من درجة الأحاسيس بالألم مقارنة مع استخدام مسكنات الألم لوحدها لدى الأطفال المسجلين في وحدة العناية المشددة	تهدف هذه الدراسة بشكل اساسي الى تقييم استخدام العقار ديكستروميثورفان المصنف كمضاد للمستقبل مع مسكنات الألم وأثره على التقليل من درجة الأحاسيس بالألم مقارنة مع استخدام مسكنات الألم لوحدها لدى الأطفال المسجلين في وحدة العناية المشددة	S	Riyadh	Dr. Mohamed Naem	Pediatric	naemm@ngha.med.sa	NONE
6	RC09/128	Intramedullary Nailing Vs M.I.P.O in Fractures of the Tibia. A Randomized Controlled Trial	دراسة عشوائية التوزيع لمقارنة عملية التسمير داخل نخاع العظم مقارنة بعملية التسمير في تثبيت طرفي العظم عند المرضى المصابين بكسور في الساق.	تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى مقارنة عملية التسمير داخل نخاع العظم مقارنة بعملية التسمير في تثبيت طرفي العظم عند المرضى المصابين بكسور في الساق.	S	Riyadh	Dr. Abdulaziz Al-Ammari	Surgery	rumaih2@ngha.med.sa	KAIMRC
7	RC10/062	A Phase III, Multicenter, Randomized, Parallel-group Study to Assess the Efficacy and Safety of Double-blind Pasireotide LAR 40 mg and Pasireotide LAR 60 mg versus Open-label Octreotide LAR or Lanreotide ATG in Patients with Inadequately Controlled Acrom	دراسة عشوائية، متعددة المراكز، من نوع المرحلة III، تتضمن مجموعات متوازنة لتقييم فعالية وسلامة الاستعمال مزوج المجهولين لكل من "باسيريوتيد ال 40 ملغم" و "باسيريوتيد ال 60 ملغم" مقابل "الاستعمال مفتوح المعلومه ل" أوكترينويد ال 40 ملغم" أو "لانريدوتيد ال 60 ملغم" في علاج المرضى المصابين بمرض العقلة(ضخامة الأطراف) غير الخاضع للسيطرة بدرجة كافية	الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم فعالية وسلامة استعمال مزوج المجهولين لكل من "باسيريوتيد ال 40 ملغم" و "باسيريوتيد ال 60 ملغم" مقابل "الاستعمال مفتوح المعلومه ل" أوكترينويد ال 40 ملغم" أو "لانريدوتيد ال 60 ملغم" في علاج المرضى المصابين بمرض العقلة(ضخامة الأطراف) غير الخاضع للسيطرة بدرجة كافية	S	Riyadh	Dr. Tariq Nasser	Medicine	karawaghab@ngha.med.sa	Novartis
8	RC10/063	Erythropoietin In Traumatic Brain Injury (EPO-TBI)	إواء الإرتروپويتين في إصابات الدماغ الرضية	الهدف من هذه الدراسة هو تقييم فعالية عقار الإرتروپويتين في إصابات الدماغ الرضية	S	Riyadh	Dr. Yaseen Arabi	ICU	arabi@ngha.med.sa	Anzics
9	RC10/097	Extending Molecular Responses with Nilotinib in Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia (CML) Patients in Chronic Phase (ENEXTnd)	توسيع نطاق الاستجابات الجزيئية مع عقار نيلوتنيب في المرضى الذين تم تشخيصهم حديثا بمرض سرطان الدم الخاضعي المزمن CML في المرحلة المزمنة (ENEXTnd)	الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الاستجابات الجزيئية لعقار نيلوتنيب في المرضى الذين تم تشخيصهم حديثا بمرض سرطان الدم الخاضعي المزمن CML في المرحلة المزمنة	S	Riyadh	Dr. Ahmed Alaskar & Dr. Ahmad Al Saeed	Oncology	askaras@ngha.med.sa	NONE
10	RC10/114	Early Predictor of Herceptin Cardiotoxicity in Breast Cancer Patients.	التنبؤ المبكر عن خلل كهربية وتلف عضلات القلب بسبب تأثير عقار هيرسبتين في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي.	الهدف من الدراسة هو محاولة تنبؤ حدوث خلل كهربية وتلف عضلات القلب بسبب تأثير عقار هيرسبتين في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي.	S	Riyadh	Dr. Omalkhair Abulkhair	Oncology	abulkhairo@ngha.med.s	KAIMRC
11	RC10/134	A Pragmatic Randomized Controlled Trial of Patient-Centered Integrated Clinical Pathways Based Versus Usual Care in An Academic Center: National Guard Health Affairs Western Region Experience. (CHAMP-Path Study)	دراسة مضبوطة بتوزيع عشوائي لدراسة الفعالية الطبية المتكاملة المتركزة على المرضى مقابل العناية الطبية الاعتيادية في مركز تعليمي: خبرة الشؤون الصحية للحرس الوطني في المنطقة الغربية.	تستجور الدراسة حول مقارنة العناية الطبية المتكاملة المتركزة على المرضى مقارنة بالعناية الطبية الاعتيادية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمنطقة الغربية.	S	Jeddah	Dr. Khaja Mujahba Quadri - Offsite Dr. Saliman Karsou - Onsite	Medicine	quadrimu@ngha.med.sa	KAIMRC
12	RC11/027	An Open label, multicenter, expanded Access Study of INC424 for Patients with Primary Myelofibrosis (PMF) or Post Polycythemia Myelofibrosis (PPV MF) or Post Essential Thrombocythemia Myelofibrosis (PET-MF)	دراسة أكليتيكية موسعة متعددة المراكز معلومة الموضوع على استخدام العقار " إي إن سي 424" في المرضى المصابين بتليف النقي الأولي (بي إن أم أف) أو تليف النقي بعد الإصابة بمرض كثرة الحمر (بي بي إن أم أف) أو تليف النقي بعد الإصابة بمرض كثرة الصفائح الدموية الاساسية (بي إي تي-أم أف)	تهدف هذه الدراسة للكشف عن مدى استخدام "العقار " إي إن سي 424" في المرضى المصابين بتليف النقي الأولي (بي إن أم أف) أو تليف النقي بعد الإصابة بمرض كثرة الحمر (بي بي إن أم أف) أو تليف النقي بعد الإصابة بمرض كثرة الصفائح الدموية الاساسية (بي إي تي-أم أف)	M	Riyadh Jeddah	Dr. Ahmed Alaskar Dr. Ahmad Al Saeed	Oncology Oncology	askaras@ngha.med.sa ahmadalsaed@yahoo.com	NOVARTIS
13	RC11/045	A Phase III, Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of MK-0431A (A Fixed-Dose Combination Tablet of Sitagliptin and Metformin) in Pediatric Patients with Type 2 Diabetes Mellitus	دراسة متعددة المراكز ، ثنائية التعمية، عشوائية التوزيع، مضبوطة وبواء وهمي، من اجل تحديد مدى سلامة وفعالية MK-0431A (A Fixed-Dose Combination Tablet of Sitagliptin and Metformin) في علاج الأطفال المصابين بالسكري النوع الثاني	الهدف من هذه الدراسة هو تحديد مدى سلامة وفعالية MK-0431A (فرض مكون من جرعة ثابتة من السيتاغليبتين و الميتفورمين) في علاج الأطفال المصابين بالسكري النوع الثاني	M	Riyadh Al Ahsa	Dr. Ibrahim Al Alwan Dr. Ali AlQarni	Medicine	alwani@ngha.med.sa	MSD
14	RC11/064	Predictors of Coronary Artery Atherosclerotic Plaques in Asymptomatic Saudi Arabian Patients	التنبؤ بمرض لويحات التصلب الشرايين التاجي في المرضى السعوديين الذين لا تظهر عليهم الاعراض	تجري هذه الدراسة بهدف الكشف عن امراض لويحات التصلب الشرايين التاجي في المرضى السعوديين والذين لم تظهر عليهم الاعراض	S	Riyadh	Dr. Mouaz Al-Mallah	Cardiac	almallahmo@ngha.med.sa	KAIMRC
15	RC11/100	Interleukin 28-B Polymorphism in HCV Genotype 4 Infected Patients: Response to Therapy, Adverse Events and Disease Severity	الانترلوكن 28-B المتعدد الأشكال B-28 في المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي من نوع سي/النوع الجيني الرابع - الاسباب و العلاج و الاعراض الجينية لتأثيره المستخدمة في العلاج و شدة المرض	دراسة لمعرفة الاسباب و العلاج و الاعراض الجينية لتأثيره المستخدمة في العلاج و شدة المرض في المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي من نوع سي/النوع الجيني الرابع والذين يحملون الانترلوكن المتعدد الأشكال B-28	S	Riyadh	Dr. Ibrahim Al Traif	Hepatobiliary science and liver transplantation	traifi@ngha.med.sa	
16	RC12/004	A Multinational Observational Study Assessing Insulin Use: Understanding the challenges Associated with Progression of Therapy-The Mosaic Type 2 Diabetes Study	دراسة تطعيمية متعددة البلدان لتقييم استخدام عقار الأنسولين: فهم التحديات المرتبطة بتطور العلاجات لمرضى السكري من النوع 2	دراسة استطلاعية من أجل فهم التحديات المرتبطة بتطور العلاجات لمرضى السكري من النوع 2	M	Riyadh	Dr. Maha El Farra	Family medicine	farraam@ngha.med.sa	Eli Lilly and company

17	RC12/018	A Multicenter, Open-label, Single-arm Study of Pertuzumab in Combination with Trastuzumab and a Taxane in First-Line Treatment of Patients with HER2-Positive Advanced (Metastatic or Locally Recurrent) Breast Cancer [PERUSE STUDY]	دراسة متعددة المراكز، مفتوحة العنوان، من مجموعة علاج واحد يعقار ترستوزوماب بالمصاحبه مع عقاري ترستوزوماب و تاكسين كخط العلاج اول للمرضى المتقدم (المتكرر) الاجنبي لمستقبل عامل نمو الشرة البشرية (HER-2)2	S	Riyadh	Dr. OmalKhair AbulKhair	Oncology	abulkhair@ngha.med.sa	Hoffmann-La Roche Ltd
18	RC12/033	Comparing Controlled Release 10mg Prostaglandin Vaginal Pessary to 3mg Prostaglandin Vaginal Tablets For Cervical Ripening	مقارنة بين الحقة المهبلية المفروزة للبروستاغلاندين والحبوب المهبلية المكونة من البروستاغلاندين	S	Jeddah	Dr. Taghreed Shams	Ob/Gyn	shamst@ngha.med.sa	KAIMRC
19	RC12/035	A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter phase III study of RAD001 adjuvant therapy in poor risk patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) of RAD001 versus matching placebo after patients have achieved complete response with first-line rituximabchemotherapy	دراسة عشوائية، مزدوجة التعمية، مضبوطة الغل، ومتعددة المراكز في المرحلة III من العلاج المساعد RAD001 عند الأشخاص القلبي التعرض للخطر من المصابين بلمفوما الخلايا البائية الكبيرة المنتشر (DLBCL) والمشاركين في دراسة دواء RAD001 بالمقارنة مع الغل المطابق بعد تحقيق المرضى استجابة تامة مع العلاج الكيمويي بواسطة ريتوكسيماب rituximab-chemotherapy كخيار اول للعلاج	S	Jeddah	Dr. Ibad El Hemaidei			NOVARTIS
20	RC12/045	Prophylaxis of Thromboembolism in Critically Ill Patients Using Combined Intermittent Pneumatic Compression and Pharmacologic Prophylaxis Versus Pharmacologic Prophylaxis Alone: A Multicenter Randomized Controlled Trial	دراسة حول الوقاية من الانسداد الخثلي في العناية المشددة البالغين باستخدام جهاز الضغط الوريدي المتقطع: دراسة عشوائية مضبوطة متعددة المراكز.	M	Riyadh Al Ahsa Jeddah	Dr. Yaseen Arabi DR. Aithan Abdulsalam DR. Fahad M. Al-Hameed	ICU	arabi@ngha.med.sa	PARTIAL - KAIMRC
21	RC12/052	Efficacy and Safety of Suboptimal Nilotinib in Patients with Subsequent Response on Imatinib Therapy (NISRI)	تقييم فعالية وامن دواء النيوتينيب لعلاج مرضى سرطان الدم النخاعي المزمن الذين كانت استجاباتهم للعلاج بدواء اليماتينيب غير مرضية استجابتهم للعلاج بدواء اليماتينيب غير مرضية	S	Riyadh	Dr. Ahmad Al Askar	Oncology	askaras@ngha.med.sa	(KACST and sbmt other than KAIMRC)
22	RC12/059	A Randomized Blinded Placebo Controlled Trial of Hydrocortisone in Critically ill Patients with Septic Shock note: with a Sub Study: ADRENAL (Adjunctive corticosteroid treatment in critically ill patients with septic shock)	تجربة سريرية عشوائية، ممتدة مع التحكم في العلاج الوهمي لدراسة الهيدروكورتيزون لعلاج مرضي الحالات الحرجة المصابين ب السمة الإنتانية	S	Riyadh	Dr. Yaseen Arabi	ICU	arabi@ngha.med.sa	Australian national health and medical research council(NHMRC)
23	RC12/061	Registry of Treatment Patterns in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) with Progression During or After Docetaxel-Based Regimen [®] PROXIMA Study	دراسة تسجيلية لانماط العلاج لمرضى سرطان البروستات النقلي المتقدم بعد او خلال اعطاء برونج الاعلاج Docetaxel	S	Jeddah	Dr. Mubarak Al-Mansour			Sanofi aventis

24	RC12/064	A Phase III Prospective, Two-Cohort Non-Randomized, Multicenter Multinational, open label Study to Assess the Safety of Assisted- and Self-Administered Subcutaneous Trastuzumab as Adjuvant Therapy in Patients with Operable Her2-positive Early Breast Cancer (Safetyher study)	دراسة متعددة المراكز، مفتوحة، مستقبلية في المرحلة الثالثة لتقييم سلامة عقار Trastuzumab المعطى تحت الجلد من قبل المريض أو بالمساعدة كعلاج مدعوم لمريض سرطان الثدي المكتشف حديثاً والقبيل للزالة عن طريق الجراحة من النوع Her2 عن طريق الجراحة من النوع Her2	الهدف من الدراسة هو تقييم سلامة عقار Trastuzumab المعطى تحت الجلد من قبل المريض أو بالمساعدة كعلاج مدعوم لمريض سرطان الثدي المكتشف حديثاً والقبيل للزالة عن طريق الجراحة من النوع Her2	S	Riyadh	Dr. Omalkhair Abulkhair	Oncology	abulkhair@ngha.med.sa	Hoffmann-La Roche Ltd
25	RC12/079	A Prospective Multicentre Randomized Controlled Trial of Early Goal Directed Sedation Compared with Standard Care in Mechanically Ventilated Patients in Intensive Care	دراسة عول المهدئات في وحدة العناية المركزة دراسة غير افتقائية مضبوطة متعددة المراكز لمقارنة المهدئات المعطاة حسب معيار التهذبة مع المهدئات المعطاة بالطريقة المعتادة للمرضى الموضوعين على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة	يحتاج غالبية المرضى الموضوعين على جهاز التنفس الصناعي إلى استخدام مهدئ واحد أو أكثر والذي يشكل خطراً مستمراً في الوريد في وحدة العناية المركزة تستخدم المهدئات بشكل منفرد أو بشكل مجموع من الأدوية للحفاظ على راحة المريض ، وعلى وجودهم خلال وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي ، ولكن نوع الدواء وطريقة إعطائه تلعب دوراً في تحديد مدى استجابة المريض للمهدئ بالزيادة أو النقصان (هل هذا التهذبة عنده أو لم يهذبه) . إلى يومنا هذا ، لا يوجد اتفاق على مستوى العلم بين الأبحاث حول اختيار الأدوية المهدئة أو الطرق المثلى لإعطائها . كما أن العديد من الأدوية المهدئة الشائعة الاستخدام لها تأثيرات جانبية مثل طول فترة الإقلمه على وحدة العناية المركزة ، و حدوث حالة الهذيان (خلة من الإحباط) بما في ذلك عتاء الهلوسة ، و نقص الأبراك العظمي بعد الشفاء من الحالة المرضية الخفيفة .	S	Riyadh	Dr. Yaseen Arabi	ICU	arabi@ngha.med.sa	Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group (ANZICS CTG)
26	RC12/080	The Effect of Daily Ginger Drinking on Platelets Function in the Saudi Population*	تأثير شرب الزنجبيل اليومي على عمل الصفائح الدموية عند السعوديين.	تهدف الدراسة لتقييم تأثير شرب الزنجبيل اليومي على عمل الصفائح الدموية عند السعوديين.	S	Riyadh	Dr. Ahmed Al Askar	Oncology	askaras@ngha.med.sa	KAIMRC
27	RC12/113	Effect of Dexmedetomidine and Ketamine on Intra Abdominal Hypertension I Critically Ill Children	تأثير عقار الديكس ميديتوميدين و كيتامين على ارتفاع ضغط الدم الداخلي عند الأطفال في العناية المركزة	تقتصر الدراسة أن التهذبة "الخفيفة" (و التي تحافظ على راحة المريض وتسمح له بالاستجابة) سوف تقلل من الوقت اللازم على جهاز التنفس الصناعي و من فترة الإقلمه في وحدة العناية المركزة و كما تقلل من حالات الهذيان الأوية المهدئة الشائعة الاستخدام مثل ديكسميديتوميدين (Dexmedetomidine) و ميوزلام (midazolam) و البروبوفول (propofol) يمكن استخدامها بشكل منفرد أو بشكل مجموع للحفاظ على راحة المريض الموضوعين على جهاز التنفس الصناعي.	S	Riyadh	Dr. Omar Hijazi	Cardiac	hijazio@ngha.med.sa	KAIMRC
28	RC12/131	A Comparative, Randomized, Parallel-group, Multicenter, Phase IIIb Study to Investigate Efficacy of Subcutaneous (SC) Rituximab versus Intravenous (IV) Rituximab both in Combination with CHOP (R-CHOP) in Previously Untreated Patients with CD20 Positive diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)	دراسة مقارنة، عشوائية، متعددة المراكز، من المرحلة ثب، ذات مجموعات علاج متواز، لدراسة فعالية استخدام عقار ريتوكسيماب بالحقن تحت الجلد مقابل عقار ريتوكسيماب بالحقن في الوريد كلاهما بمصاحبة العلاج الكيميائي (R-CHOP) في المرضى المصابين بسرطان خلايا الغد الليمفاوية الكبيرة من النوع "بي" المنتشر (DLBCL)، الإيجابي لـ CD20 والذين لم يتلقوا له علاجاً من قبل	الغرض من هذه الدراسة هو جمع معلومات لمعرفة ما إذا كان استخدام عقار ريتوكسيماب بالحقن تحت الجلد مقابل استخدام عقار ريتوكسيماب بالحقن في الوريد يعمل بشكل أفضل أو أكثر أمناً عند علاج المرضى المصابين بسرطان خلايا الغد الليمفاوية الكبيرة من النوع "بي" المنتشر.	S	Jeddah	Dr. Mubarak Al-Mansour			Hoffmann la Roche
29	RC12/145	Effect of Heparin 20 u /kg/hr. Continuous Infusion on Central Venous Catheter Related Thrombosis in Children Admitted to Pediatric Cardiac Intensive Care Unit*	فعالية التسريب الوريدي المستمر للهيبارين في تقليل خطر حدوث التمزق في القسطر الوريدية المركزية عند الأطفال .	الهدف من هذه الدراسة هو بحث فعالية التسريب المستمر للهيبارين عبر المجرا بجرعة 20 وحدة / كغ / ساعة في تقليل خطر حدوث التمزق في القسطر الوريدية المركزية عند الأطفال .	S	Riyadh	Dr. Omar Hijazi	Cardiac	hijazio@ngha.med.sa	KAIMRC
30	RC13/1/16	Randomized Multicentre Comparative Trial to Evaluate the Long Term Effectiveness of the use of Carbaglu® in Patients with Propionic Acidemia (PA) or Methylmalonic Acidemia (MMA)	دراسة عشوائية متعددة المراكز لدراسة فعالية بواء الكاربغلو مع الأدوية الحالية على المدى الطويل في علاج مرضى ارتفاع الحمض الأيضي الوراثي والحمض الميتابولي الوراثي بالمقارنة بالأدوية الحالية وحدها	الهدف من هذه الدراسة هو بحث فعالية بواء الكاربغلو مع الأدوية الحالية في علاج مرضى ارتفاع الحمض الأيضي الوراثي والحمض الميتابولي الوراثي بالمقارنة بالأدوية الحالية وحدها.	S	Riyadh	Dr. Majid Alfdhel	Pediatrics	fadhelma@ngha.med.sa	EUROPE, ORPHAN
31	RC13/202	Safety and efficacy of Dabigatran in stroke prevention in atrial fibrillation in King Abdulaziz Medical City*	دراسة مدى سلامة وفعالية الدابغاتران في حذبة الملك عبدالعزيز الطبية	تقييم مستوى سلامة وفعالية بواء الدابغاتران والذي لتقليله لمنع حدوث الخثرات والتي قد تنشأ نتيجة الارتخاف البطيئي.	S	Riyadh	Dr. Abdulmohsen Almusad	Cardiac	a_almusaad@yahoo.com	KAIMRC
32	RC13/261	Efficiency of Piezo-Corticision in reducing treatment time in treatment of class II div I subjects: A randomized controlled clinical trial	دراسة سريرية لفعالية اجراء Piezo-Corticision في تقليل وقت المعال عند علاج مرضى الأسنان الذين يعانون من سوء الإطباق/الدرجة الثانية	تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية اجراء Piezo-Corticision في تقليل وقت المعال عند علاج مرضى الأسنان الذين يعانون من سوء الإطباق/الدرجة الثانية	S	Riyadh	Dr. Sally Al Yousef	Dental	alvousefsa@ngha.med.sa	KAIMRC

33	CT13/001	A Randomized, Multi-Center Study to Evaluate Cardiovascular Outcomes with ITCA 650 in Patients Treated with Standard of Care for Type 2 Diabetes	دراسة علمية سريرية لتقييم نتائج العلاج بـ ITCA650 على القلب والأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم عدد ونوع الحالات المرتبطة بأجهزة الجسم المتعددة والقلب والأوعية الدموية واختيار مدى أمان وفعالية العلاج طويل الأجل بجهاز عقار ITCA650 الذي يوضع تحت الجلد في منطقة البطن وسواها. المشاركون في الدراسة تلقى الدواء الذي كانوا يتناولونه من قبل لعلاج مرض السكري خلال فترة الدراسة التي تستمر لخمسة سنوات للمشارك الواحد.	M	Alahsa	Dr. Ali Al Qarni			Intarcia ITCA
					Jeddah	Dr. Hawazen Abdullah Zarif			
34	CT13/002	A Three-Arm, Randomized, Open Label, Phase II Study of Everolimus In Combination With Exemestane Versus Everlimus Alone Versus Capecitabine In The Treatment Of Postmenopausal Women With Estrogen Receptor Positive, Locally Advanced, Recurrent, Or metastatic breast cancer after recurrence or progression on prior letrozole or anastrozole	المرحلة الثالثة من دراسة إكلينيكية عشوائية، معقمة الموضوع، ثلاثية المجموع للمقارنة بين العلاج باستخدام العقار إيفروليموس مع العقار إكزيمستان وبين العلاج بالعقار إيفروليموس وحده فقط وبين العلاج بالعقار كابسيتابين في معالجة النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث اللاتي أمسن سرطان الثدي المتكرر أو الانتقالي المتقدم والإيجابي لمستقبلات الإستروجين بعد حدوث تكرار الإصابة أو تطور المرض مع استخدام العقار تروزول أو العقار أنستروزول قبل ذلك.	S	Riyadh	Dr. Omalkahir Abulkhair	Oncology	abulkhair@ngha.med.sa	NOVARTIS
35	CT13/004	A Randomized Trial Comparing Pre-operative Chemo-radiotherapy with Cisplatin and Fluorouracil Versus Chemotherapy with Docetaxel and Irinotecan in PET Non Responders Resectable Cancer Esophagus: A Multicenter Study (PENAT: PET Evaluated Neo-Adjuvant Ther	تجربة عشوائية تقارن المعالجة الكيميائية الإشعاعية قبل الجراحة بعقار سيسبلاتين وفلوروروسيل مقابل المعالجة الكيميائية بعقار دوكسيتاكسيل وإيرينوتيكان لمرضى سرطان المريء القابل للاستئصال الغير المستجيبين للعلاج حسب التصوير المقطعي بالبورزيترون.	S	Riyadh	Dr. Ashwaq Al Olayan	Oncology	alolayanas@ngha.med.sa	KFSH&RC
36	CT13/005	A multi-centre randomised controlled trial of an Open Lung Strategy including Permissive Hypercapnia, Airway Recruitment and Low Airway Pressure in patients with acute respiratory distress syndrome. (PHARLAP study	دراسة غير انتقائية منسوبة متعددة المراكز لدراسة استراتيجية لمرضى "الارتعاج" والتي تشمل الزيادة الاختيارية لمعدلات ثاني أكسيد الكربون بالدم وتثبيع الحويصلات الهوائية وخفض الضغط في المجرى التنفسي عند مرضى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. (استراتيجية فرالاب (PHARLAP).	S	Riyadh	Dr. Yaseen Arabi	ICU	arabi@ngha.med.sa	NHMRC(the Alfred hospital and health research council of newzeland
37	CT13/006	A Phase 3, Double-Blind, Randomized, Efficacy and Safety Comparison of Prasugrel and Placebo in Pediatric Patients with Sickle Cell Disease	دراسة في المرحلة الثالثة، مزدوجة التعمية، عشوائية التوزيع، لمقارنة مدى فعالية وأمان عقار براسوجريل والدواء المعوم عند المرضى الأطفال الذين يعانون من مرض الخلايا المنجلية.	S	Riyadh	Dr. Reem Sudairy	Oncology	sudairy@ngha.med.sa	Eli Lilly and company
38	CT13/007	A Phase IV Double-Blind Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial Assessing the Effect of 2 Month Consumption of Vetal Laban Including Lactobacillus Acidophilus NCFM on Functional Gastrointestinal Symptoms Among Subjects Fulfilling Rome III Criteria for Irritable Bowel Syndrome*	دراسة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية يتم التحكم فيها باستخدام دواء وهمي يتم تكميل تأثيره استهلاك لبن فيتال لمدة شهرين بما في ذلك لكتوباسيلوس أسيديفيلوس NCFM على الأعراض المعوية الوظيفية بين المرضى الذين يتوافقون مع معايير روما III لمتلازمة القولون العصبي.	S	Riyadh	Dr. Abdullah Aljadhali	Gastroenterology	jahdalya@ngha.med.sa	Almarai company and Danisco sweetners
39	CT13/008	International Study of Comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches	دراسة مقارنة دولية حول مدى فعالية التدخلات العلاجية والجراحية مسبقاً (نقص التروية).	S	Riyadh	Dr. Mouaz Al-Mallah	Cardiac	almallahmo@ngha.med.sa	US National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)
40	CT13/009	STandaRd Issue TRANsfusion versus Fresher red blood cell Use in IntenSive care a randomised controlled trial - TRANSFUSE	دراسة عشوائية منسوبة متعددة المراكز لدراسة استراتيجية مقارنته فائدة نقل فئة الدم الأحدث المناسبة للمريض والمتاحة في بنك الدم، مقارنة بالمعيار الحالي للممارسة وهو استخدام الدم المناسب والأقدم من حيث تاريخه باستخدام الدم المناسب والأقدم من حيث تاريخه. جميع مرضى العناية المركزة الذين يحتاجون لنقل دم خلال فترة وجودهم بالمستشفى سيخضعون لهذه الدراسة. حجم العينة المواد دراستها 5000 مريض وفي الوقت نفسه الذي سيجرى فيه هذه الدراسة في مستشفيات أخرى حول العالم منها أستراليا ونيوزلندا.	S	Riyadh	Dr. Sami Alsolamy	Emergency	solamys@ngha.med.sa	NHMRC
41	CT13/010	A Phase III, Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo- and Metformin- Controlled Clinical Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of Stiglipitin in Pediatric Patients with Type 2 Diabetes Mellitus with Inadequate Glycemic Control	دراسة سريرية في المرحلة الثالثة، متعددة المراكز، مزدوجة التعمية، عشوائية، مقارنته بالدواء الوهمي والميتفورمين، من أجل تقييم سلامة وفعالية العلاج بالمستجلبيتين لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني ممن عندهم سكر الدم لديهم	M	Riyadh	Dr. Ibrahim Alwan	COM	alwani@ngha.med.sa	MSD:- Merck Sharp and Dohme
					Alahsa	Dr. Ali Al Qarni			

42	CT13/011	Dyslipidemia International Study Two Lipid Target Achievement in High Risk Patients with Coronary Heart Disease	الدراسة الدولية حول خلل الشحوم في الدم: يهدف من هذا البحث إلى تقييم مدى تحقيق الأهداف العلاجية للمصابين بأمراض القلب التاجية المعرضين لمخاطر عالية (DYSIS II)	S	Riyadh	Dr. Saleh Al Jaser	Medicine	jasers@ngha.med.sa	MSD
43	CT13/014	Adherence to treatment in COPD and Asthma: a Representative observational, multicentre, cross-sectional study in adults	الالتزام بالعلاج بالنسبة للإستناد الربوي المزمن والربو: دراسة قائمة على الملاحظة، غير تدخلية، متعددة المراكز منمحصرة على البالغين (ADCARE)	S	Riyadh	Dr. Mohammed Al Ghobain	Medicine	alhallahmo@ngha.med.sa	GSK
44	CT13/015	Herpes Zoster-Associated Burden of Illness and Health Care Utilization in Immunocompetent Patients: Multi-Country Observational Study (HARMONY)	الألم المترافق مع القوباء المنطقية (الهربس زoster) و الرعاية الصحية لدى المرضى أصحاب مناعة مؤهلة- دراسة مراقبة متعددة الدول (HARMONY)	M	Jeddah	Dr. Ali Raddadi			JSS Medical Research INC-MSD
45	CT14/001	ABSORB FIRST Registry: An international post-market registry of patients with de novo lesions in previously untreated vessels treated with Absorb BVS	تسجيل دولي لتتبع سلامة وفعالية ورضا المرضى باستخدامات مستجدة في الأوعية الدموية الغير معالجه مسبقا والتي تم علاجها بواسطة دعامة Absorb BVS الوعائية	S	Riyadh	Dr. Mohammed Balghaith	Cardiac	mbalghith@hotmail.com	Abbott Vascular
46	CT14/002	Study to Observe the Effectiveness and Safety of Ranibizumab Through Individualized Patient Treatment and Associated Outcomes LUMINOUS™	دراسة لمتابعة فعالية وسلامة رانيبيزوماب من خلال العلاج الفردي للمريض والنتائج المصاحبة	M	Jeddah	Dr. Karim Talaat			Novartis
47	CT14/003	An Open-Label, Multinational, Multicenter, Phase IIIb Study with Subcutaneous Administration of Trastuzumab in Patients with Her2-Positive Early Breast Cancer to Evaluate Patient Satisfaction	دراسة من المرحلة البحثية الثالثة ب، مفتوحة العلوان، متعددة المراكز، تجرى في دول متعددة يتم فيها إعطاء عقار تراستوزوماب تحت الجلد في المرضى المصابين بسرطان الثدي مبكر إيجابي لمستقبل عامل نمو البثرة البشري 2 (HER2) من أجل تقييم رضا المرضى	S	Jeddah	Dr. Ahmed Alshehri		shehri01@ngha.med.sa	Hoffmann-La Roche Ltd
48	CT14/004	The FLAIR Study Functional Lesion Assessment of Intermediate stenosis to guide Revascularisation Randomised Comparison of iFR to FFR	بطيقة تقييم أفة التصيق المتوسط لتدوير التاجي لتوجيه إعادة التوعية وهي دراسة توتوية للتدوير التاجي على أساس قياسات IFR لشدة التصيق، مقارنة مع FFR	S	Jeddah	Dr. Ali Al Ghamdi	Cardiac	ghammadial@ngha.med.sa	Volcano Corporation
49	CT14/005	An International Multicenter Prospective Observational Study to Evaluate the Epidemiology, HumAnistic and Economic Outcomes of Treatment for Chronic Hepatitis C Virus (HCV) MOSAIC	دراسة دولية، تطوعية، متعددة المراكز، تقوم على الملاحظة، لتقييم الوبائيات والنتائج الالاسيائية والاقتصادية للعلاج الخاص بمرض التهاب الكبد المزمن من النوع "سي" (HCV).	S	Jeddah	Dr. Faisal Sanai		sanaifa@ngha.med.sa	Abbvie
50	CT14/006	Observational Prospective Study In Management of 1st line KRAS Wildtype mCRC with Erbitux, Cetuximab) (Erbitux™)	دراسة إشرافية مسجلة في إدارة الخط الأول : من علاج سرطان القولون والمستقيم المنتشر المتعلق بجين كيراس KRAS wild type باستخدام OPTIMIZE (Cetuximab)- Erbitux™	S	Riyadh	Dr. Ashwaq Olayan	Oncology	alolayanas@ngha.med.sa	Merck Serono
51	CT14/007	Middle East & North Africa Registry to characterize Rate of RAS mutation status in newly diagnosed patients with mCRC	مكتب تسجيل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوصيف معدل طفرة RAS في المرضى الذين تم تشخيصهم مؤخرا بإصابتهم بسرطان القولون مستقيمي نقلي (منتشر) (MORE-RAS).	S	Riyadh	Dr. Ashwaq Olayan	Oncology	alolayanas@ngha.med.sa	Amgen-ClinArt
52	CT14/008	An observational, multi-center study to evaluate the safety of deferasirox in the treatment of pediatric patients with non-transfusion-dependent iron overload	الدراسة دراسة بالملاحظة متعددة المراكز لتقييم سلامة العقار ديفيراسيروكس في علاج المرضى الأطفال المصابين بمرض زيادة الحديد غير المعتمدة على نقل الدم	S	Jeddah	Dr. Arwa Omar Al Yamani		yamaniao@ngha.med.sa	Novartis
53	CT14/009	A Phase III, Randomized, Double-Blind, Double-Dummy, Multicenter Study Comparing the Efficacy and Safety of 2 Doses of daily oral ONO-4641 versus IFN-beta-1a 30mg i.m. qw in subjects with RRMS	تجربة مع شأء، مزدوجة التعمية، مزدوجة التصوير، متعددة المراكز، من المرحلة الثالثة تقارن فعالية وسلامة جرعتين من ONO-4641 0.0 ملغم و 0.0 ملغم يؤخذ يوميا عن طريق الفم مقابل ميكرو غرام يؤخذ في العزل أسبوعياً إنتر فيرون 1a-β بجرعة 0. لدى المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد متكرر التكلس والهجوم	S	Riyadh	Dr. Mohammed Al-jumah	Medicine	jumahm@ngha.me.sa	Merck KGaA, Darmstadt, Germany
54	CT14/010	Verifying Insulin Strategy and Initial Health Outcome Analysis	التأكد من إستراتيجية الأنسولين وتحليل نتائج الصحة الأولية	S	Dammam	Dr. Reem Al Amoudi	Medicine	amoudir@ngha.med.sa	Eli Lilly and company

55	CT14/011	Easypod Connect: A Regional, Multi-center, Observational Study to Evaluate Adherence and Long Term Outcomes of Therapy in Paediatric Subjects using Easypod Electromechanical Device for Growth Hormone Treatment	دراسة رصدية وطنية و متعددة المراكز لتقييم مدى الالتزام و النتائج على المدى البعيد لمعالج الأطفال بهرمون النمو بواسطة الجهاز الإلكتروني (Easypod) دراسة رصدية على المدى البعيد	يهدف الدراسة الى تكوين قاعدة بيانات وطنية من أجل تقييم البيانات حول مدى الالتزام بالمعالج و مستوى النمو الذي تحققت مجموعة كبيرة من الأطفال المساهمين بحل في النمو بعد علاجهم بهرمون النمو باستخدام الجهاز الإلكتروني Easypod.	S	Riyadh	Dr. Angham Nasser AL Muatir	pediatric	mutaira@ngha.med.sa	Merck Serono
56	CT14/012	A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus	دراسة عشوائية متعددة المراكز لمعرفة ما إذا كان كان لواء تيكاجريلور 90مجم تأثير على منع حدوث الوفيات القلبية والسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب الأحداث المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، وإذا كان الأمر كذلك، معرفة الاختلافات بينه وبين الدواء الوهمي. الدواء الوهمي هو مادة مشابهة لمعيار التجريبية في مظهره وطريقة استعماله ولكنه لا يحمل أي خصائص طبية.	يتم إجراء هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان لواء تيكاجريلور تأثير على منع حدوث الوفيات القلبية والسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب الأحداث المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، وإذا كان الأمر كذلك، معرفة الاختلافات بينه وبين الدواء الوهمي. الدواء الوهمي هو مادة مشابهة لمعيار التجريبية في مظهره وطريقة استعماله ولكنه لا يحمل أي خصائص طبية.	S	Riyadh	Dr. Basam Bdeir	Cardiac	bdeirm@ngha.med.sa	Astrazeneca
57	CT14/013	Long-Term Evaluation of Patients with Heart Failure	سجل قصور القلب للمدى الطويل	هذه الدراسة تهدف الى مراجعه الرعاية المقدمة لاختصاص يشاهبون حالتك خلال وجودهم بالمستشفى وكيف يستشعر بعد 12 شهر .	S	Riyadh	Dr. Mohammad Bassam Bdeir	Cardiac	bdeirm@ngha.med.sa	European Society of Cardiology
58	CT14/014	EURObservational Research Programme Chronic Ischemic Cardiovascular Disease Pilot phase	دراسة أمراض تصلب الشرايين الناتجة المزمنة	يهدف الدراسة الى تقييم نوعية العلاج والرعاية الطبية المقدمة للمرضى ومقارنتها مع الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في مراكز عالمية أخرى من أجل تطوير طرق وبنوعية العلاج لأمراض تصلب الشرايين الناتجة على المستوى المحلي والعالمي.	S	Riyadh	Dr. Ali M Alghamdi	Cardiac	ghamdial@ngha.med.sa	European Society of Cardiology
59	CT14/015	Evaluation of Asthma Management in Middle East North Africa Adult population Descriptive study on the management of asthma in asthmatic Middle East North Africa adult population	دراسة مركزية حول مستوى التحكم في الربو عند البالغين الذين يعانون من هذا المرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.	دراسة وطنية و إقليمية على الربو ومحدداته	S	Riyadh	Dr. Hamdan AL-Jahdali	Medicine	jahdali@yahoo.com	Astrazeneca
60	CT15/001	Cardiac – Oncology Toxicity in Breast Cancer, the European Registry	دراسة السمية القلبية لمعالج أورام الثدي	يهدف الدراسة الى تقييم الحالة الصحية وحالة القلب للمرضى حينما تتم المعالجة بالأدوية مضادة السرطان لسرطانة الثدي في أوروبا. وهذا البحث سيؤدي إلى توصيات لتطوير معالجة سرطانة الثدي على المستوى المحلي، الاقليمي والعالمي.	S	Riyadh	Dr. Mouaz Al Mallah	Cardiac	amalialho@ngha.med.sa	European cardiac association as part of EURO observational research program
61	CT15/004	Multicentre, randomised, controlled, open-label study comparing the efficacy and safety of slow repeated IV infusions of 2 doses of Doxorubicin Transdrug, (20mg/m2 or 30mg/m2) to those of Best Standard of Care in patients with advanced Hepatocellular Carcinoma after failure or intolerance to Sorafenib. (ReLive Study)	دراسة متعددة المراكز، عشوائية، مراقبة، ومفتوحة التسمية لمقارنة سلامة وفعالية التسريب البطيء المتكرر في الوريد لجرع عن طريق عقار Doxorubicin Transdrug™ 2 (مع أفضل معيار الرعاية، لدى المرضى المساهمين بسرطان الخلايا الكبدية المتقدمة، بعد فشل العلاج بعقار سورافينيب أو عد. الفترة عسى تحسمو. ReLive Study	الهدف من الدراسة هو تقييم فعالية وسلامة عقار Doxorubicin Transdrug بجرعتين مختلفتين مقارنة بالدواء الاعيادي	S	Riyadh	Dr. Faisal Sanai		sanaifa@ngha.med.sa	Onxeo
62	CT15/005	A Prospective, Longitudinal, Multinational, Observational Study to Describe Patterns of Care and Outcomes of Men who are at High Risk for Poor Clinical Outcomes after Experiencing Biochemical Failure Following Definitive Prostate Cancer	دراسة وصدية، متعددة الجنسيات، وتتبع على مدى فترات طويلة من الزمن، واستشرافية لوصف أنماط الرعاية ونتائجها في الرجال الذين هم في خطر كبير لعلاقتهم ببيولوجيا عنق عنق سرطان البروستاتا البهائية، والرجال المساهمين بسرطان البروستاتا المتقدم للأعضاء والرجال الذين يعانون من سرطان البروستاتا القفلي عند التشخيص الأولي.	الهدف منها هو رصد وتوثيق الطريقة التي يتم بها علاج الأشخاص المساهمين بسرطان البروستاتا	S	Riyadh	Dr. Sultan Al Khateeb	Surgery	alkhateeb@ngha.med.sa	Clin-Art
63	CT15/007	International Registry to Assess Medical Practice with Longitudinal Observation for Treatment of Heart Failure (REPORT-HF)	سجل عالمي لتقييم الممارسة الطبية مع مراقبة طويلة لمعالج قصور القلب	الهدف من سجل REPORT-HF هو مراقبة الرعاية الطبية الحالية للمرضى الذين لديهم قصور قلبي في دول مختلفة حول العالم من المخطط أن يتم إدراج حوالي ٢٠٠٠٠٠ مريضاً وقت مكوثهم في المستشفى بسبب تعرضهم لتولية قصور قلبي. تشمل المناطق المشاركة آسيا، أمريكا الشمالية والوسطى، والجنوبية، أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط، وأستراليا.	S	Al Ahsa	Dr. Ayman Farouk Soliman	Medicine	asoliman66@yahoo.com	Novartis Therapeutic Company
64	CT15/008	A 12-week treatment, multi-center, randomized, double-blind, double-dummy, parallel group study to assess the efficacy and safety of switching from salmeterol/fluticasone to QVA149 (indacaterol maleate/glycopyrronium bromide) in symptomatic COPD patients (FLASH study).	دراسة مجموعة متوازنة عشوائية مزدوجة الإعدام متعددة المراكز بمستم لمدة 12 اسبوعاً من أجل تقييم فعالية وسلامة التحول من سالميترول/فلوتيكاسون إلى العقار QVA149 (الينكاتيرول مالات/جليكوبيريونيوم بروميد) في مرضى يعانون من أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن	الهدف البات ان العقار QVA 149 110/50 ملجم مرة واحدة في اليوم افضل من سالميتورول / فلوتيكاسون 50/500 ملجم مرتين في اليوم في تحسين مدى ومقدار تحرك الهواء من خلال الرئتين	S	Jeddah	Dr. Amr Suhail Albanna	Medicine	bannaas@ngha.med.sa	Novartis
65	CT15-011	A Phase III randomized, double-blind, placebo-controlled study of LEE011 or placebo in combination with tamoxifen and goserelin or a non-steroidal aromatase inhibitor (NSAI) and goserelin for the treatment of premenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast cancer	دراسة عشوائية مزدوجة التعمية ومضبوطة بدواء وهمي في المرحلة الثالثة حول دواء LEE011 أو الدواء الوهمي بالتزامن مع تاموكسيفين والغوزريلين أو مثبط أروماتيز غير ستيرويدي + غوزريلين) أملاً وهدفه منع نشأة لدى النساء قبل انقطاع الطمث المصاحبات بسرطان الثدي المتقدم الإيجابي مستقبلات الهرمون/ هير 2 HER 2	الهدف من الدراسة هو معرفة ما إذا كان دواء LEE011 - عندما يؤخذ مع العلاج المعياري (تاموكسيفين + غوزريلين أو مثبط أروماتيز غير ستيرويدي + غوزريلين) أملاً وهدفه منع نشأة لدى النساء قبل انقطاع الطمث المصاحبات بسرطان الثدي المتقدم الإيجابي مستقبلات الهرمون/ هير 2 HER 2	S	Riyadh	Dr. Ahmed Saadeddinah	Oncology	saadeddinah@ngha.med.sa	Novartis

66	CT15-020	DISCOVERing Treatment Reality of Type 2 Diabetes in Real World Settings	اكتشاف واقع العلاج للسكري من نوع 2 في العالم الحقيقي	<p>إبراسة DISCOVER هي دراسة بحث يتم تنفيذها لفهم كيفية تدير مرضى يعانون من هذا المرض حالياً في ممارسات الحياة الحقيقية، من أجل زيادة المعرفة عن تدير المرض، واحتمالية تحسين جودة العلاج ونتائجه وتقليل خطر المضاعفات في المستقبل. يتطلب منك أن تشارك في هذه الدراسة لأنك قد شخصت بسكري من نوع 2 وقد خصصت للعلاج بدواء مضاد للسكري</p>	S	Riyadh	Dr. Ali Ibrahim, Al Farhan	Endocrinology	farhanal@ngha.med.sa	Astrazeneca
----	----------	---	--	---	---	--------	----------------------------	---------------	--	-------------